

**Nota: dosaggi ed accortezze**

Ogni medicina omeopatica esiste in varie dinamizzazioni espresse in numeri, corrispondenti a differenti intensità d'azione. Per il pronto intervento consiglio la 30 CH alla quantità di 3 granuli ogni 4 ore, almeno 15 minuti lontano dai pasti, se non diversamente indicato. Con il miglioramento dei sintomi la frequenza di somministrazione scenderà a 3 granuli ogni 6-8 ore, fino a graduale sospensione. Il miglioramento deve essere evidente entro 24-36 ore. Individuare una medicina precisa non può sostituire una corretta diagnosi e la conseguente valutazione del rischio.

---

## **Emorroidi e ragadi anali**

Le emorroidi sono delle varici delle vene del plesso emorroidario; è una patologia molto frequente; a volte sono complicate da sanguinamento, infezione e trombosi. Risentono negativamente delle difficoltà del fegato e della regolarità della funzione intestinale, per cui la cura dell'alimentazione è necessaria quanto spesso insufficiente. La ragade anale è una fessurazione o un'ulcera che si forma nel canale anale, può presentarsi associata alle emorroidi o da sola; provoca facilmente sanguinamento e dolore.

### **Pomata *Aesculus hippocastanum***

Associato o meno ad **Hamamelis**, **Peonia**, **Rathania**: utile applicata dopo la defecazione e dopo un lavaggio con acqua fredda, non è sufficiente alla guarigione.

### ***Aesculus hippocastanum***

Emorroidi che **protrudono**, **dolorose**, **bluastre**; peggiorano con lo sforzo di evacuare, **dopo l'evacuazione**, in piedi, camminando; senso di pesantezza, di pienezza, di secchezza, con prurito e **dolori tipo scheggia o come se ci fossero aghi**; **il dolore si estende ai lombi, al sacro, alle anche**; soggetto pigro, inattivo, lamentoso, irritabile.

### **Aloe**

Le emorroidi **sporgono come un grappolo d'uva**, bruciano, sono dolenti, come paralizzanti; **migliorano con applicazioni fredde**; spesso danno prurito profondo e sensazione di spina; c'è **debolezza** e spesso **diarrea** subito dopo mangiato o bevuto, anche **perdita involontaria di feci**; può esserci stitichezza con ansia per il problema della defecazione; **soggetto spesso irritabile e scontento**.

### **Hamamelis**

**Emorroidi sanguinanti**, sono bluastre e c'è abbondante perdita di sangue scuro; possono essere **dolorose e pulsanti**; emorroidi in gravidanza; soggetto affetto da **problemi venosi ed emorragici**; **si sente dolente, ammaccato**; pensa costantemente ai propri disturbi con lamenti.

### **Peonia**

Le emorroidi danno **una sofferenza tremenda**, con **dolore costante, intollerabile, giorno e notte**; il soggetto è costretto a **separare le natiche con le proprie mani, a camminare tutta la notte o a sdraiarsi sul pavimento**; possono essere ulcerate o

associate a ragadi, o trombizzate; **soggetto ansioso, pieno di paure**, molto colpito da notizie spiacevoli.

### **Nux vomica**

Emorroidi interne, **dopo abusi alimentari, con stitichezza e perdita di sangue evacuando**; prolasso; stitichezza con **stimolo frequente ed inefficace ad evacuare**; i dolori migliorano con le applicazioni fredde e peggiorano col movimento; soggetto a **dolori e crampi**: allo stomaco, all'addome, in vescica; soggetto stressato, insonne, irritabile, che abusa di stimolanti, alcol e tabacco.

### **Acidum nitricum**

**Ragadi anali**, con o senza emorroidi, con stimolo a defecare impellente e inefficace; **dolori violenti per ore dopo la defecazione**; soffre di herpes, verruche, fessurazioni, ulcere, con dolore come se ci fosse una scheggia conficcata; soggetto ansioso per la salute, con **pessimo carattere**, sospettoso, cupo, pieno di rancori ed odio, scoraggiato.

### **Rathania**

**Emorroidi** che protrudono con l'evacuazione, **associate a ragadi**, con **senso di costrizione anale; dolori molto prolungati dopo aver evacuato**; dolori acuti, come se ci fossero conficcate schegge di vetro, come per punture di coltello; soggetto sensibile, facilmente sconvolto, superstizioso, soggetto a nevrosi.